

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการ”เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ชื่อ นางศิริวรรณ วิมลทิพย์ ตำแหน่ง จพว.สัตวบาลสังกัด จทอ.พน.ปท
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สว่างวีระวงศ์

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสูคน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวด่าง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
- ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อ นางสาว สุนิษา ตำแหน่ง อว. สัตวบาลสังกัด อว. วท. พิษ
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ส. 1

ให้ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าหัวข้อ (๑๐ คะแนน)

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร"
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสู่คน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะ ของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษาเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
 - เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
 - เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวด่าง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่ม และทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

๑

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการ”เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ชื่อ ทางอกฤษ ลีศักดิ์ ตำแหน่ง เทพนิทัศน์ สิวมาล สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ บึง

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสูคน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทฯ ภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวดำง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
- ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๕.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อ พาทกษ สัต ตำแหน่ง เทคนิคงานสัตวบาล สังกัด โรงเรียนปทุมธานี
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จ

ให้ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าหัวข้อ (๑๐ คะแนน)

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า "โรคคอตีบแอฟริกาในสุกร"
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสูคน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะ ของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษาเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทาเวทภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
 - เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
 - เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แทั้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคคอตีบแอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

๑๓

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการ”เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ชื่อ นายวราภรณ์ ดอนน้อย ตำแหน่ง ผู้ตรวจการสมาคม สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ห้วยคต อ.เวียงสา จ.น่าน

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสูคน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทฯ เวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวด่าง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกระยะของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่ม และทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

๓

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อ นางสาวทิพวรรณ ลอนน้อย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์สังกัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จวนเกษตร ๒ ถนนมิตรภาพ/สัตว

ให้ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าหัวข้อ (๑๐ คะแนน)

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสู่คน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะ ของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษาเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทฯเอกชน บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
 - เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
 - เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวด่าง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

๑๐

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการ”เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ชื่อ พอลลภวิทย์ นิลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์อาวุโส สังกัด กรมปศุสัตว์
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ วังสามหมอ, จ.หนองบัวลำภู

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสู่คน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทฯ เวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวดำแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้ในทุกระยะของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อ..... พยธมรณ วัฒนชัย ตำแหน่ง..... นวอ.สัตวบาลสังกัด..... สบจ.๖๓๐.พิษณุ
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ..... สบจ.๖๓๐.พิษณุ

ให้ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าหัวข้อ (๑๐ คะแนน)

- ✓ ๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
- ✓ ๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
- ✓ ๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
- ✗ ๔. โรคนี้ติดต่อสู่คน
- ✓ ๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะ ของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษาเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ✓ ๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
- ✓ ๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
 - เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
 - เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
- ✓ ๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวด่าง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุ
- ✓ ๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
- ✓ ๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

๓๗

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการ”เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ชื่อ อ. อธิกรณ รุ่งรงค์ ตำแหน่ง ผู้จัดการงานทั่วไป สังกัด สนง.ปศุ.จ.จกน
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ อ.ศรีนครินทร์

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสู่คน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทฯ เวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวด่าง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่ม และทุกช่วงอายุ
๙. การป้องกัน
- ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

๑๓

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อ น.ส.ฉัตรภา ใจงาม ตำแหน่ง วิศวกรระบบสังกัด รพ.สต.บ้าน
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ บ้านสีบัว

ให้ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าหัวข้อ (๑๐ คะแนน)

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสู่คน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะ ของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มีการรักษาหรือวัคซีนในการรักษาเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
 - เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
 - เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวด่าง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในท่วงช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่ม และทุกช่วงอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๕.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

๑๐

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการ”เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ชื่อ กชกร อวรณ์ คงสุโขตราชวงศ์ ตำแหน่ง ช่างสังเกต สังกัด วิซิง ๑๑ สัตหีบ
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ชนบท

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสู่คน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทฯ ภัณฑาคาร บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวดำ มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในท่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
- ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อของทางออก/ชื่อของบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าปศุสัตว์ สังกัด ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ..... ปศุสัตว์อำเภอ

ให้ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าหัวข้อ (๑๐ คะแนน)

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร"
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสูคน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะ ของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มีการรักษาหรือวัคซีนในการรักษาเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทฯ เวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
 - เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
 - เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวด่าง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในท่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

๐๓

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการ”เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ชื่อ นายปิ่นผ่อง ภิรมชาติ ตำแหน่ง คหบดีจากฟาร์มเลี้ยงสุกร สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เขาสวนกวาง

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสัตว์
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มีการรักษาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวดำแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่ม และทุกช่วงอายุ
๙. การป้องกัน
- ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

๒

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อ ทองใจทอง ศรีมาตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปลัดศัตว์อำเภอ บึงฉลือ

ให้ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าหัวข้อ (๑๐ คะแนน)

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคคหิวแอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสูคน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะ ของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มีการรักษาหรือวัคซีนในการรักษาเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทฯ เวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
 - เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
 - เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวด่าง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในท่วงช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคคหิวแอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

๑๓

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการ”เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ชื่อ ฉลวย เกษมทรัพย์ ไร่โอบยงค์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองสาหร่าย สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ บ้านเสด็จ

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสูคน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวดำง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วงอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อ จตุพรภักดิ์ จิว วิชา ๒๐๐๓ ตำแหน่ง ปลัดสัตวแพทย์เขตหนองแขม สังกัด ปศุสัตว์เขตหนองแขม
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ อำเภอหนองแขม

ให้ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าหัวข้อ (๑๐ คะแนน)

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้อีกว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนีติดต่อกับคน
๕. โรคนี้อาจให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะ ของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มีการรักษาหรือวัคซีนในการรักษาเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนีเพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
 - เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
 - เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนีมีอาการ ผิวด่าง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แห้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการ”เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ชื่อ นายสุรินทร์ นริศ ตำแหน่ง พวค,สบ.ปศุสัตว์สังกัด สงข. ๖๖๐.๔๗
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ บ้านม่วง

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสูคน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทฯ เวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวดำแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่ม และทุกช่วงอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

(Handwritten mark)

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อ.....ตำแหน่ง.....สังกัด.....
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ.....

ให้ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าหัวข้อ (๑๐ คะแนน)

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสูคน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะ ของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษาเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
- เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
 - เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวดำง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แทั้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่ม และทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
- ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

๑๐

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการ”เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ชื่อ โดยชัยมงคล พงษ์พรหม ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ พัฒนาสุขภาพปศุสัตว์

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสู่คน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวงแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อ นายชัยมงคล ฟองพอง ตำแหน่ง สัตวแพทย์ประจำหน่วยงานสังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์อำเภอเสด็จ

ให้ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าหัวข้อ (๑๐ คะแนน)

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า "โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร"
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสูคน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะ ของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษาเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
 - เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
 - เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวด่าง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการ”เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

ชื่อ นายวราเทพ วรภักดิ์ ตำแหน่ง ปลัดสุกรอำเภอเมืองสุรินทร์ สบ-๒๗.ก.๒๑๖
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เมืองสุรินทร์

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้ว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนี้ติดต่อสู่คน
๕. โรคนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษา เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้เพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสนี้ยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้มีอาการ ผิวแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แท้ในทุช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม

แบบทดสอบความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ชื่อ โคจรภาพ มาภักดิ์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก สังกัด อำเภอเมืองตาก
กลุ่ม/ฝ่าย/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เมืองตาก

ให้ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าหัวข้อ (๑๐ คะแนน)

๑. African Swine Fever คือ โรครุนแรงในสุกร ภาษาไทยเรียกโรคนี้อีกว่า “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”
๒. เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าเกิดโรคจะทำให้สุกรตายเป็นจำนวนมาก
๓. มีวัคซีนป้องกันและมียารักษาโรค
๔. โรคนีติดต่อสู่คน
๕. โรคนี้อาจให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้สุกรป่วยตายเป็นจำนวนมาก สุกรที่ป่วยสามารถเป็นพาหะ ของโรคได้ตลอดชีวิตและไม่มียารักษาหรือวัคซีนในการรักษาเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรม การเลี้ยงสุกรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ บริษัทผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๖. สุกรป่วยเป็นโรคนี้อาจเพราะกินเศษอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน ถูกเห็บที่มีเชื้อกัดสุกร เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ปนเปื้อน สามารถแพร่กระจายไวรัสได้หรือ สัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย นอกจากนี้เชื้อไวรัสยังสามารถพบในเนื้อสุกรที่ไม่ได้ผ่านการปรุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรกึ่งดิบกึ่งสุกที่ทำมาจากสุกรที่ติดเชื้อ
๗. นิยามในการเฝ้าระวัง: สุกรมีการตายเฉียบพลัน
 - เกษตรผู้เลี้ยงรายย่อย (น้อยกว่า ๕๐ ตัว) มีสุกรตายตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไปใน ๑ วัน
 - เลี้ยงฟาร์ม : มีสุกรตายมากกว่า ๕ % ใน ๒ วัน
๘. สุกรที่ป่วยเป็นโรคนี้อาจมีอาการ ผิวดำ มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะใบหู ท้อง หลัง มีอาการทางระบบอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร แทั้งในทุกช่วงของการตั้งท้องพบในทุกกลุ่มและทุกช่วยอายุ
๙. การป้องกัน
 - ปรับระบบการเลี้ยงสุกรให้มีระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐาน GFM หรือ GAP
 - งดใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร หากจำเป็นต้องเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารควรนำไปต้มให้สุกก่อน
 - ติดตามข่าวสารการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจากกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด
 - สังเกตอาการสัตว์ที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
๑๐. เมื่อพบสุกรตามเฉียบพลันเป็นจำนวนมากแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันทีหรือติดต่อ Call Center: ๐๖๓ ๒๒๕ ๖๘๘๘ หรือแจ้งผ่าน Application DLD ๔.๐ (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
 - ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร ออกจากฟาร์ม
 - ห้ามผ่าชันสูตรซากเองภายในฟาร์ม